

## Formation continue à distance : questions d'examen

**En quoi le profil neurocognitif des patients schizophrènes et bipolaires est-il différent?  
(lecture format PDF)**

### **QCM :**

- 1) Un examen neuropsychologique oriente de manière significative le diagnostic différentiel entre schizophrénie et trouble bipolaire.
- 2) Les parents au premier degré de patients bipolaires pourraient également présenter certaines limitations cognitives par rapport à la population normale.
- 3) La remédiation cognitive a fait ses preuves de manière évidente dans le traitement des patients schizophrènes.
- 4) Les différences de fonctionnement cognitif entre les patients schizophrènes et les patients bipolaires sont plutôt de nature qualitative que quantitative.
- 5) Les différences observées entre les profils cognitifs des patients schizophrènes et bipolaires pourraient être imputables à une proportion plus élevée d'hommes, de symptômes négatifs plus sévères et à un âge plus jeune au début de la maladie chez les patients schizophrènes.

### **QROC :**

Comment la recherche doit-elle s'adapter en vue de développer un hypothétique traitement agissant sur les troubles cognitifs chez les patients schizophrènes et bipolaires ?  
Quel outil pourrait-on utiliser ? Serait-il également valable pour les patients bipolaires ?  
Pourquoi ?