

Formation continue à distance : questions d'examen

TDAH et psychose (lecture format PDF)

QCM :

- 1) A propos de la prévalence du TDAH, il touche autant les garçons que les filles
- 2) A propos de la prévalence du TDAH, sa prévalence au sein d'un pays est indépendante du niveau de revenu de ce dernier
- 3) Concernant le lien entre le TDAH et la Schizophrénie les deux troubles ont en commun un déficit attentionnel.
- 4) Concernant le lien entre le TDAH et la Schizophrénie les patients schizophrènes ont fréquemment présenté des symptômes de TDAH durant leur enfance.
- 5) Les stimulants ont une efficacité douteuse à court terme
- 6) Les stimulants ne semblent pas entraîner de modification du volume cérébral
- 7) Les stimulants sont, à l'instar de l'atomoxetine, associés à un risque accru de symptômes psychotiques ou maniaques.
- 8) Les stimulants permettent aux enfants traités sur une durée de plus de 6 ans, de réaliser des performances égales à celles des sujets sains.
- 9) Les stimulants pourraient avoir un effet bénéfique sur la symptomatologie psychotique négative.

QROCs :

- 1) Décrivez le phénomène de sensibilisation consécutif à la prise de stimulants. Où en est le niveau de preuve ? Une étude ayant été menée chez des patients dans le décours d'un épisode psychotique n'a pas pu étayer ce phénomène, pourquoi ?