

Permanente vorming op afstand - Examenvragen

Sedatie, rijvaardigheid en antipsychotica (lectuur in PDF-formaat)

Meerkeuzevragen:

- 1) De sedatie die olanzapine veroorzaakt, schijnt onafhankelijk te zijn van de dosis.
- 2) Als de patiënt geen verklaring wil ondertekenen waarin staat dat hij/zij correct geïnformeerd is over het verlies van rijvaardigheid, mag de psychiater de weigering van de patiënt enkel vermelden in het medisch dossier.
- 3) Risperidon zou minder sedatief zijn dan haloperidol.
- 4) De patiënten ontwikkelen meestal een zekere tolerantie voor de sedatieve werking van clozapine.
- 5) De psychiater kan pas medeverantwoordelijk geacht worden als hij niet kan bewijzen dat hij de patiënt die niet mag rijden uitdrukkelijk geïnformeerd heeft om zijn rijbewijs aan de overheid terug te bezorgen.

Open vraag:

Hoelang moet een schizofreniepatiënt symptomenvrij zijn om volgens de wet (die erg streng en onaangepast lijkt) te mogen rijden?

Als een patiënt zijn rijbewijs wil halen, hoelang zal dat dan geldig zijn?

Als een patiënt die zijn rijbewijs wil halen, hallucinaties heeft zonder onvoorspelbaar, agressief of impulsief gedrag en zonder invloed van medicatie op het rijgedrag, hoelang zal zijn rijbewijs dan geldig zijn?